



โรค พิษสุนัขบ้า



“ปีหนึ่งคนไทยถูกสุนัขกัด
ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน”

เมื่อถูกสัตว์สงสัยป่วย
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือช่วน
ต้องล้างแผล ใส่ยา
กักหมา 10 วัน
และหาหมอ

เมื่อถูกสุนัขหรือแมว กัด ช่วน ต้องทำดังนี้

1. รีบล้างแผลให้เร็วที่สุดด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้ง ให้ถึงกัน
แผล ล้างสบู่ออกให้หมด เช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อรักษา
แผลสด
2. จดจำสัตว์ที่กัดให้ได้เพื่อสืบหาเจ้าของ/**กักสัตว์ไว้ดูอาการ
10 วัน** สอบถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
3. ไป**หาหมอ**หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรับการป้องกัน
ที่ถูกต้อง

คำแนะนำสำหรับคนเลี้ยงสุนัข

1. นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า**ทุกปี**
(ปีแรกควรฉีด 2 ครั้ง)
2. ไม่ปล่อยสุนัขไปเล่นพ่วนในที่สาธารณะ ทุกครั้งที่น่าสุนัข
ออกนอกบ้าน ต้องอยู่ในสายจูง
3. ไม่นำสุนัขไปปล่อย และต้องคุมกำเนิดไม่ให้มีสุนัข
มากเกินไป



Get it on
Google play



Available on the
App Store



สำนักโรคติดต่อทั่วไป

DDC
1422
สายด่วนกรมควบคุมโรค

กด ดู ไร โรค

<http://thaigcd.ddc.moph.go.th>



โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ เป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น ชะนี กระรอก กระแต แต่พบมากที่สุดโนสุนัข และรองลงมาคือ แมว

คนหรือสัตว์จะติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ เมื่อถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้อกัดหรือข่วน หรือน้ำลายสัมผัสกับบาดแผล เยื่อบุตา เยื่อจมูก เยื่อบุปาก เช่นถูกเลีย หรือน้ำลายกระเด็น โดยเชื้อจะอยู่ในน้ำลาย ถ้าเป็นสุนัขและแมว จะพบว่าเมื่อเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ออกมากับน้ำลาย ตั้งแต่ก่อนแสดงอาการ 1-7 วัน



อาการที่พบในคน

ส่วนใหญ่ระยะฟักตัวของโรค ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ - 6 เดือน แต่บางรายมีระยะฟักตัวสั้นมาก ไม่ถึงสัปดาห์ หรืออาจนานเกิน 1 ปี อาการเริ่มแรก คือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัด แล้วลามไปส่วนอื่น กระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพื่อเจ้อ กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว กลั้วน้ำ ปวดท้องน้อยและขา กล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เกร็ง อัมพาต หมดสติ และตายในที่สุด



อาการที่พบในสุนัข

ระยะฟักตัวของโรคหลังจากถูกกัดหรือข่วน จะอยู่ในช่วง 3-8 สัปดาห์ ไม่เกิน 6 เดือน และจะตายภายใน 10 วัน หลังจากแสดงอาการ ซึ่งมีทั้งแบบดุร้าย และแบบซึม โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะแรก

สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม

ระยะตื่นเต้น

สุนัขเริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวาย ตื่นเต้น หงุดหงิด ไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของไม่เลือก ม่านตาขยายกว้าง

ระยะอัมพาต

สุนัขมีอาการทางตกลิ้นมีสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปาก น้ำลายไหล ขย้อนอาหารคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี้ย ทรงตัวไม่ได้ล้มลง อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด

ကာ 5 ย กันสุนัขกัด



ย1 อย่าแหย่ สุนัขให้โมโห



ย2 อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือ ทำให้สุนัขตกใจ



ย3 อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า

ย4 อย่าหยิบ จานข้าว หรือเคลื่อนย้ายอาหาร ขณะสุนัขกำลังกินอาหาร



ย5 อย่ายุ่งหรือเข้าไปใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ